

Erstes Übungsblatt

Ausgabe: 19. April 2011

Abgabe: Keine, Besprechung in einer der Übungen

1 Hyperkubus

Definition: Der n -dimensionale Würfel Q_n ist ein Graph mit folgenden Knoten und Kanten: Die Knotenmenge besteht aus den Wörtern der Länge n über dem Alphabet $\{0, 1\}$. D.h. $V(Q_n) = \{0, 1\}^n$. Zwei Knoten sind genau dann adjazent, wenn die zugehörigen Wörter sich in genau einer Stelle unterscheiden.

1. Wieviele Knoten hat Q_n ? Wieviele Kanten hat Q_n ?
2. Beschreiben Sie die Knotengrade der Knoten im Q_n .
3. Betten Sie Q_1 , Q_2 , Q_3 und Q_4 (wenn möglich kreuzungsfrei) in die Ebene ein.
4. Betten Sie Q_4 kreuzungsfrei auf der Oberfläche eines Torus ein.

2 Facettengradfolge

Gegeben ein planarer Graph G mit einer kreuzungsfreien Einbettung in die Ebene, die f Facetten enthält. Sei a_i , $1 \leq i \leq f$, die Anzahl der zur Facette i inzidenten Kanten von G . Nummeriere die Facetten so, dass die Folge (a_1, a_2, \dots, a_f) nichtabsteigend sortiert ist.

Kann es zu einem planaren Graph G zwei Einbettungen in die Ebene geben, so dass die zugehörigen Zahlenfolgen unterschiedlich sind ?

3 Die Schiefe

Die *Skewness* eines Graphen G ist die minimale Anzahl von Kanten, die aus G gelöscht werden müssen, damit der resultierende Graph planar ist. D.h. die Skewness eines Graphen ist Null genau dann, wenn der Graph planar ist.

1. Zeigen Sie, dass für einen einfachen Graphen G mit $n \geq 3$ Knoten und m Kanten gilt:
$$skewness(G) \geq m - 3n + 6.$$
2. Berechnen Sie die *Skewness* von K_3 , K_5 , $K_{3,3}$ und K_6 .

Bitte Wenden!

4 Bäume

Beweisen Sie die Äquivalenz der folgenden Aussagen für einen Graphen G mit n Knoten:

1. G ist ein Baum, d.h. G ist zusammenhängend und kreisfrei.
2. G ist zusammenhängend und hat $n - 1$ Kanten.
3. G ist kreisfrei und hat $n - 1$ Kanten.